

التاريخ / ٥ رجب ١٤٠٥ هـ
الموافق ٢٥ مارس ١٩٨٥ م

تعيم رقم (٦ / ٨٥)

بشأن استعمال الأنسولين تركيز ١٠٠ وحدة والمحاقن الخاصة به
اعتباراً من تاريخ ١٥/٤/٨٥

إلى جميع السادة الصيادلة ومساعدي الصيادلة

بناءً على تعيم السيد وكيل الوزارة رقم ١٩ لسنة ١٩٨٥ المؤرخ ٢١/٣/١٩٨٥ الصادر استناداً
للقرارات الوزارية رقم ١٧٥ و ٣٦٠ لسنة ١٩٨٤ بشأن استعمال الأنسولين تركيز ١٠٠ وحدة لكل ١ سم^٣
وكذلك المحاقن الخاصة بها ذات المائة علامة دون سواها ووقف استعمالات التركيزات الأخرى للأنسولين
والمحاقن الخاصة بها. وكذلك استناداً للقرار الوزاري رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٥ القاضي ببدء العمل اعتباراً من
تاریخ ١٥/٤/١٩٨٥ بالخطة الموضوعة من قبل لجنة التنسيق المشكّلة لهذا الخصوص.

يرجى من جميع الزملاء الصيادلة ومساعدي الصيادلة العاملين بقسم الصيدلة بمختلف صيدليات
المستشفيات والمصحات والوحدات الصحية المجمعة والمستوصفات والمراكز الصحية الأخرى التقيد
بالتاليات التالية بكل دقة وأمانة توخيًا لخدمة المرضى وحرصاً على مصلحتهم وحياتهم :

١ - التأكد من وجود الأنسولين تركيز ١٠٠ وحدة لكل ١ سم^٣ والمحاقن الخاصة به عيار ١٠٠ علامة في
مراكزهم الخاصة قبل بدء تنفيذ الخطة وتوفيرها للاستعمال من التاريخ المحدد وضمان استمرارية
وجودها.

٢ - سحب جميع أنواع الأنسولين ذات التركيزات المختلفة والتي كانت تستعمل مسبقاً والتخلص منها
وكذلك المحاقن الخاصة بها، والتأكد من عدم وجود أي بقايا منها لضمان عدم استعمالها بالخطأ ومنع
حدوث المضاعفات.

٣ - عند صرف الأنسولين ذو التركيز الجديد مع المحاقن الخاصة به لمرضى السكر والذين يقومون بحقن
أنفسهم، يراعى إرشادهم على طريقة استعمالها بصدر رحب، وكذلك توعيتهم والتنبيه عليهم بعدم
استعمال الأنواع القديمة وضرورة التخلص منها حتى لا يقعوا في مشاكل الخلط بين النوعين مع
ضرورة التأكيد على خطورة انخفاض السكر نتيجة لاستعمال الأنسولين ذو التركيز الجديد بالمحاقن
القديمة.

٤ - يراعى عند التدريب التأكيد على أنه نظراً لزيادة التركيز للأنسولين الجديد، فإن أي زيادة أو نقصان
بسط في الحجم المعطى سيؤدي إلى خطأ ملموس في حساب الكمية الموصوفة واللازمة للمريض،
ولذا فإنه يجب مراعاة الدقة عند سحب الكمية الموصوفة مع مراعاة عدم وجود فقاعات من الهواء أو فراغ
دون محلول الأنسولين في المحقق.

٥ - تبليغ الطبيب المعالج فوراً عن أي مريض يلاحظ عليه أنه على وشك الإصابة بغيبوبة وذلك لاتخاذ

الاسعافات الازمة له، كما يرجى ملاحظة أية مضاعفات قد يتعرض لها المرضى المراجعون بعد حقنهم بالعلاج وإبلاغ الأطباء المعالجين بذلك فورا.

٦ - إرشاد المرضى المستعملين للأنسولين تركيز ١٠٠ وحدة كيفية طريقة حفظها في منازلهم في الثلاجة لتجنبها التأثر بعوامل الحرارة والرطوبة والضوء وغيرها وضرورة ابعادها عن متناول الأطفال.

٧ - ضرورة تسجيل حقن الأنسلين ذات التركيز ١٠٠ وحدة الواردة للصيدلية وكذلك المنصرف منها أولا بأول وذلك حفاظا على العهدة مع الاهتمام بملحوظة تاريخ مفعولها.

٨ - على جميع المسؤولين بصيدليات المستشفيات ومسئولي الخدمات الصيدلانية بالمناطق الصحية متابعة تنفيذ هذه التعليمات والتتأكد من سلامة اتباعها وإبلاغنا عن أي ملاحظات يرونها.

٩ - التعاون مع الأطباء وأعضاء الهيئة التمريضية وأمناء المستوصفات والمراكز نحو تطبيق نظام استعمال الأنسلين مائة وحدة بما يضمن سلامة المرضى آملين التقيد بما جاء أعلاه وتنفيذها بكل دقة والله الموفق.

رئيس قسم الصيدلية