

التاريخ : ٢٠٠٣ / ١٠ / ٤ م

تعميم رقم (٧٢) لسنة ٢٠٠٣ م

السادة / مدراء المناطق الصحية المحترمين

السادة / مدراء المستشفيات المحترمين

السادة / الاطباء المحترمين

السادة / الصيادلة المحترمين

لقد لاحظت الوزارة في الآونة الأخيرة ازدياد الطلب على استعمال

دواء Novo Seven = rFVIIa

ونظرا لكون الدواء حديث نسبيا وباهظ التكاليف ، فقد تقرر وضع ضوابط لصرف واستعمالات الدواء المذكور تتضمن تحديد الاطباء المخولين بوصفه ، والامراض ومواقع العلاج التي يحتاجها استعماله وفقا للنماذج المرفقة بهذا التعميم ووفقا للاجراءات الآتية :-

أولا : حالات استعمال الدواء :-

- حالات التريف في الهيموفليا «أ» و«ب» الوجود في دمهم مضادات للعوامل ٨ أو ٩ (Inhibitors) ، وكذلك حالات النقص الوراثي للعامل ٥٧ مرفق (١) .

ثانيا : الحالات الاخرى لاستعمال الدواء :-

- حالات التريف خلال أو بعد العمليات الجراحية أو حالات هبوط الكبد أو امراض الصفائح فهذه الحالات لاتزال تحت التجربة (Relative indications) مرفق (٢) على أن تتبع الاجراءات الآتية في مثل هذه الحالات .

يتم توقيع طلب صرف الدواء من استشاري الوحدة المعالجة بعد موافقة

استشاري امراض الدم وبعد التأكد من أن هذا الدواء لا يستعمل كمرحلة أولى في حالات التريف أي بعد استعمال الطرق المعتادة الأخرى .

وعلى جميع الصيدليات توفير نماذج طلب صرف الدواء وعدم صرفه إلا بعد استيفائه بالكامل ويتم تجميع هذه الطلبات في كل صيدلية وارسالها لادارة المستودعات الطبية للمراجعة من قبل اللجنة المشكلة لضوابط صرف الدواء المنوه عنه .

يرجى من الجميع التقيد بما ورد بهذا التعميم بكل دقة .

وكيل وزارة الصحة